



What to expect going home with your pet after sedation:

We recommend closely monitoring upon returning home, allowing your pet to rest in a quiet isolated location away from other pets. It is important that you not allow your pet to jump on and off furniture or stairs without assistance to prevent injury.

It's fairly common for your pet to experience some or all of the following mild effects after sedation or anesthesia. Many pets are sleepy or uncoordinated for at least 12 to 24 hours afterwards. If listed effects last longer please contact a veterinarian.

- Drowsiness
- Vomiting
- Diarrhea or loose stool
- Difficulty walking
- Decreased appetite
- Droopy eyes

Very rare but potentially more serious side effects can include:

- Excessive or prolonged vomiting
- Excessive or prolonged diarrhea
- Excessive drowsiness- unable to respond to calling or petting
- Extended inappetance
- Difficulty breathing
- Incontinence
- Collapse
- Inability to urinate or defecate

Please contact us during work hours Monday-Friday 8am- 5 pm or Saturday 8am- 5pm at (301) 838-9506. If we are closed please contact a veterinarian at an emergency clinic open 24 hours:

Bluepearl
Specialty + Emergency Pet Hospital
1 Taft Ct Rockville, MD 20850
(301)-6373228

Metropolitan Emergency Animal Clinic
Emergency Veterinary service
11503 Rockville Pike Suite A Rockville, MD 20852
(301) 368-6253



Qué esperar después de la sedación de sus mascotas:

Recomendamos monitorear de cerca al regresar a casa, permitiendo que su mascota descanse en un lugar tranquilo y aislado, lejos de otras mascotas. Es importante que no se permita que su mascota se suba y baje de muebles o escaleras sin ayuda para evitar lesiones.

Es bastante común que su mascota experimente algunos o todos los siguientes efectos leves después de la sedación o la anestesia. Muchas mascotas tienen sueño o no están coordinadas durante al menos 12 a 15 horas después. Si los efectos enumerados duran más tiempo, comuníquese con un veterinario.

- Somnolencia
- Vomitando
- Diarrea o heces blandas
- Dificultad caminando
- Disminución del apetito
- Ojos caídos

Los efectos secundarios muy raros pero potencialmente más graves pueden incluir:

- Vómitos excesivos o prolongados
- Diarrea excesiva o prolongada
- Somnolencia excesiva - Incapaz de responder a llamadas o caricias
- Inapetencia prolongada
- Respiración dificultosa
- Incontinencia
- Colapso
- Incapacidad para orinar o defecar

Por Favor comuníquese con nosotros durante el horario laboral de Lunes-Viernes de 8am-5pm o los Sábados de 8am-1pm al (301) 838-9506. Si estamos cerrados, comuníquese con un veterinario en una clínica de emergencia abierta las 24 horas:

Bluepearl
hospital de mascotas especializado
y de emergencia
1 Taft Ct Rockville, MD 20850
(301)-637-3228

Metropolitan Emergency Animal Clinic
Servicio veterinario de emergencia
11503 Rockville Pike Suite A Rockville, MD 20852
(301) 368-6253